

全国各省法定报告传染病疫情动态摘抄(9302期)

麻 疹

青海: 本月共报告发病383例, 死亡6例, 病死率1.57%。发病较多的地区有民和86例(死亡4例), 尖扎57例, 贵南36例。1岁以下占总病例数的13.49%, 1~7岁组占37.70%, 7~15岁组占30.16%, 15岁组以上占17.86%。本月麻疹发病的病死率较高, 死亡病例均为0~3岁。在患者中, 7岁以下占51.19%, 15岁以下占31.35%。

天津: 本月报告74例, 比上月(18例)上升3.11倍, 比去年同期(3例)上升23.67倍, 上月仅两个区有病例报告, 本月11个区、县出现病例, 其中津南区、静海县较多, 分别为30例和20例。津南区病例集中在双桥地带, 发病年龄以14~15岁居多。该区在麻疹流行期组织易感儿接种了麻疹疫苗和免疫球蛋白。静海县东滩头乡出现暴发疫情(19例)。

云南: 云南省西双版纳州景洪县勐旺乡补远村是离县城200多公里的边远山寨28年没有出现过麻疹病例, 于去年底由外源性引入病人后, 至今年1月中旬共发生麻疹237例, 罹患率高达21%。发病最小年龄2个月, 最大30岁, 5岁以下儿童仅占5.8%。

出血热

湖南: 据长沙市北区卫生防疫站报告, 某大学发生与实验动物有关的流行性出血热病人十余例, 且有死亡病例发生。希有关出血热实验动物的单位加强管理, 自觉送检, 并接受检疫部门意见, 杜绝类似情况发生。

甲 肝

上海: 根据历来春季发病高峰规律, 本月急肝疫情随着春季高峰的到来, 幅度进一步增大。本月全市共报告2854例(市区1527例, 郊县1327例), 其特点为:

(1) 本市市、郊疫情升幅相当, 但郊县月发病率高于市区; (2) 各区、县疫情普遍上升, 但增幅不相一致; (3) 各区、县大多有1~2个病例较多的街道(乡), 但病例分布仍为散发。 (4) 20岁以上青壮年及工人、农民仍为主要发病对象; (5) 据各区、县流行病学调查分析, 均证实今春高峰成因仍然是多因素的。其中尤以外出史, 包括贝类在内的海水产、喜吃零食以及多次食用可能被污染的食物等因素密切相关。

病因未明疾病

江苏: 2月份以来金坛县局部地区出现一批以低热、全身弥漫性红疹、眼结膜充血为特征的病人, 部分有咽炎表现。据不完全统计已发生了150多例, 本病主要罹及小学生, 已在6所学校一些班级引起了暴发。该病可能经呼吸道传播, 传播速度较快, 各地要严加防范。

疫情管理

云南: 昭通地区巧家县卫生局所发巧卫字(1993)2号文《关于疫情管理的通知》规定: 从93年3月1日起, 每缺报一句, 扣年终全院职工奖1%, 疫情报告卡填写不合格, 一张扣自主分配部分的0.5%, 为此, 请各疫情报告单位一定按规定准时向县防疫站报告。

中国预防医学科学院流研所流行病室